Optimaler Erntezeitpunkt

Hilfestellung zur Bestimmung

SILOMAIS

August | **September** | **Oktober**

Beginn der Beobachtung | **Beginn der Siloreife**

20 % TS	25 – 26 % TS	26 – 27 % TS	28 % TS	32 – 33 % TS	35 % TS	38 % TS
Beginn der Stärke-einlagerung		Einschätzung der Siloreife möglich	Beginn der Siloernte möglich	Optimaler Silomais-Erntetermin erreicht	Ende der optimalen Ernte	Spätester Erntetermin

Optimaler Erntezeitpunkt unter Berücksichtigung von:

Zustand Restpflanze	bei Trockenheit	schnell abreifend	synchron abreifend	Stay Green-Typ
Verhältnis Kolben / Restpflanze	bei Trockenheit	hoher Kolbenanteil	mittel	niedriger Kolbenanteil

Zeitraum für Silomaisbeerntung

KÖRNERMAIS



Kornquerschnitt		
Wassergehalt	**38 – 35 %**	**< 32 % (Schwarzer Punkt)**
	• CCM-Ernte • Ganzkolbenernte • Beginn der Körnermaisernte	• Optimale Körnermaisernte (Physiologische Reife erreicht)

Glasig ▶
Teigig ▶
Milchig ▶

Mehr Informationen auf **www.agrar.bayer.de/dekalb**

DEKALB SEED YOUR SUCCESS