

Den Bestand

so früh wie möglich  
behandeln



Ab  
**BBCH 21**

kann Atlantis® Flex  
eingesetzt werden\*



\*Auf drahtierten Flächen nicht vor dem 16. März

Leichte  
**Nachfröste**

beeinflussen die Wirkung  
und Verträglichkeit nicht



Extrem wichtig

**Luftfeuchtigkeit**



Faktor

**Luftfeuchtigkeit**

verbessert die Aufnahme des Wirkstoffs



Über  
**60 % Luftfeuchte**  
ist die Anwendung **empfohlen**



unter  
**50 %**  
keine Anwendung



Daher bieten sich die

**Abendstunden** zum Spritzen an  
ohne Sonneneinstrahlung  
und trockene Luft



Klutige  
**Flächen**

im Frühjahr vorab walzen



**Bodenbeschaffenheit**

beachten



Dann  
**eine Woche warten**

damit die Samen aus den Kluten keimen



Auf taunassen  
**Beständen**

ist eine Anwendung **möglich**  
(sofern keine Spritztropfen abrollen)



Nicht unmittelbar  
vor Regen  
anwenden



Anwendung  
**mitteltropfig**

Ausnahmen nur, wenn abdriftmindernde  
Technik vorgeschrieben ist




Bei extremen  
**Besatzstärken**

oder **metabolisch resistentem**  
**Ackerfuchsschwanz** ist  
das **Additiv Biopower**  
zwingend notwendig

Hier empfiehlt sich darüber hinaus  
der Zusatz von **AHL** oder **SSA**\*

**Additiv Biopower**  
Verbessert die  
**Wirkstoffaufnahme**

Vorgeschriebene Mischung  
**bei Atlantis® Flex**



\*Die Freigabe gilt nur für Atlantis® Flex