



Checkliste

Ackerfuchsschwanzbekämpfung



Den Bestand so früh wie möglich/nötig behandeln!

- a) Ab BBCH21 kann Atlantis Flex eingesetzt werden
- b) Auf drainierten Flächen darf Atlantis Flex erst ab dem 16. März eingesetzt werden
- c) Leichte Nachfröste beeinflussen die Wirkung und Verträglichkeit NICHT

Der Faktor Luftfeuchtigkeit ist extrem wichtig: Er verbessert die Aufnahme des Wirkstoffs

- a) Die relative Luftfeuchtigkeit liegt am besten über **60 %** - Keine Anwendung unter 50 % Luftfeuchte
- b) Spritzungen am Besten in die Abendstunden legen, ohne direkte Sonneneinstrahlung und trockener Luft

Zusatz des Additivs Biopower ist zwingend notwendig

- a) Bei extremen Besatzstärken oder metabolisch resistentem Ackerfuchsschwanz empfiehlt sich der Zusatz von AHL (max. 30 l / ha) oder SSA (max. 10 kg / h).
Die Freigabe gilt nur für Atlantis Flex und Atlantis WG

Nicht unmittelbar vor Regen anwenden

- a) Eine Behandlung auf taunassen Beständen ist möglich (sofern keine Spritztropfen abrollen)
- b) Möglichst fein- bis mitteltropfig applizieren; Ausnahmen nur, wenn abdriftmindernde Technik vorgeschrieben ist

Klutige Flächen im Frühjahr vorab walzen

- a) dann nochmals eine Woche warten, damit die Samen aus den Kluten keimen